

# ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЛОР-ОРГАНОВ

Нозология /показания к АБ терапии	Рекомендуемые препараты	Возраст 6 мес–12 лет	Возраст > 12 лет /или масса тела > 40 кг	Примечание
<b>Внебольничная пневмония</b> (дети > 1 года)	Амоксициллин	20-40 мг/кг/сут в 3 приема	0,5 г 3 р/сут	Частота выявления «атипичных» возбудителей (микоплазмы, хламидии) выше в возрасте ≥ 5 лет
	Азитромицин	10 мг/кг/сут в 1-й день, 5 мг/кг/сут со 2 по 5 день, или 10 мг/кг/сут 1 р/день в течение 3 дней	0,5 г/сут в 1-й день, 0,25 г/сут со 2 по 5 день, или 0,5 г/сут 1 р/день в течение 3 дней	
	Кларитромицин	15 мг/кг/сут в 2 приема	0,25 г 2 р/сут	
	Амоксициллин/клавуланат	20-40 мг/кг/сут в 3 приема, или 25-45 мг/кг/сут в 2 приема (по амоксициллину)	0,625 г 3 р/сут или 1,0 г 2 р/сут или 2,125 г 2 р/сут*	
<b>Острый риносинусит:</b> ✓ тяжелое течение ✓ длительность симптомов ОРЗ >10 дней ✓ нет эффекта от симптоматической терапии (24-48 ч)	Амоксициллин	20-40 мг/кг/сут в 3 приема	0,5 г 3 р/сут	Не осложненное течение, не принимал АБ в предшествующие 3 мес.
	Азитромицин	10 мг/кг/сут в 1-й день, 5 мг/кг/сут со 2 по 5 день, или 10 мг/кг/сут 1 р/день в течение 3 дней	0,5 г/сут в 1-й день, 0,25 г/сут со 2 по 5 день, или 0,5 г/сут 1 р/день в течение 3 дней	
	Кларитромицин	15 мг/кг/сут в 2 приема	0,25 г 2 р/сут	
	Амоксициллин/клавуланат	20-40 мг/кг/сут в 3 приема или 25-45 мг/кг/сут в 2 приема (по амоксициллину) 2 р/сут (ЛФ с модиф. высвобождением)	0,625 г 3 р/сут или 1,0 г 2 р/сут или 2,125 г 2 р/сут	
<b>Острый средний отит:</b> ✓ тяжелое течение ✓ возраст < 2-х лет ✓ нет эффекта от симптоматической терапии (24-48 ч)	Амоксициллин	20-40 мг/кг/сут в 3 приема	0,5 г 3 р/сут	Не осложненное течение, не принимал АБ в предшествующие 3 мес.
	Азитромицин	10 мг/кг/сут в 1-й день, 5 мг/кг/сут со 2 по 5 день, или 10 мг/кг/сут 1 р/день в течение 3 дней	0,5 г/сут в 1-й день, 0,25 г/сут со 2 по 5 день, или 0,5 г/сут 1 р/день в течение 3 дней	
	Кларитромицин	15 мг/кг/сут в 2 приема	0,25 г 2 р/сут	
	Амоксициллин/клавуланат	20-40 мг/кг/сут в 3 приема, или 25-45 мг/кг/сут в 2 приема (по амоксициллину)	0,625 г 3 р/сут или 1,0 г 2 р/сут	
<b>Острый тонзиллит/фарингит:</b> ✓ «+» Стрептатест ✓ высокий риск стрептококковой инфекции ✓ нет эффекта от симптоматической терапии (24-48 ч)	Феноксиметилпенициллин	1-6 лет: 15-30 мг/кг/сут в 4 приема 6-12 лет: 10-20 мг/кг/сут в 4 приема	0,25 г 3 р/сут	Не осложненное течение, не принимал АБ в предшествующие 3 мес.
	Амоксициллин	20-40 мг/кг/сут в 3 приема	0,5 г 3 р/сут	
	Цефалексин	25-50 мг/кг/сут. в 3 приема	0,5 г 4 р/сут	
	Азитромицин	12 мг/кг/сут 1 р/день в течение 5 дней	0,5 г/сут в 1-й день, 0,25 г/сут со 2 по 5 день, или 0,5 г/сут 1 р/день в течение 3 дней	
	Кларитромицин	15 мг/кг/сут в 2 приема	0,25 г 2 р/сут	
	Амоксициллин/клавуланат	20-40 мг/кг/сут в 3 приема, или 25-45 мг/кг/сут в 2 приема (по амоксициллину)	0,625 г 3 р/сут или 1,0 г 2 р/сут.	
	Цефуросим аксетил	20-30 мг/кг/сут в 2-3 приема	0,25-0,5 г 2 р/сут	
<b>Острый бронхит</b>	Амоксициллин	20-40 мг/кг/сут в 3 приема	0,5 г 3 р/сут	АБ рутинно не назначаются! Показаны только в случае отсутствия клинического улучшения ≥ 7 дней
	Азитромицин	10 мг/кг/сут в 1-й день, 5 мг/кг/сут со 2 по 5 день, или 10 мг/кг/сут 1 р/день в течение 3 дней	0,5 г/сут в 1-й день, 0,25 г/сут со 2 по 5 день, или 0,5 г/сут 1 р/день в течение 3 дней	
	Кларитромицин	15 мг/кг/сут в 2 приема	0,25 г 2 р/сут	
<b>Обострение хронического риносинусита</b>	Амоксициллин/клавуланат	20-40 мг/кг/сут в 3 приема, или 25-45 мг/кг/сут в 2 приема (по амоксициллину)	0,625 г 3 р/сут или 1,0 г 2 р/сут	
<b>Обострение хронического среднего отита</b>	Амоксициллин/клавуланат	20-40 мг/кг/сут в 3 приема, или 25-45 мг/кг/сут в 2 приема (по амоксициллину)	0,625 г 3 р/сут или 1,0 г 2 р/сут	АБ показаны при неэффективности местной терапии и/или выраженном обострении

\* дети ≥ 16 лет



АНТИБИОТИК - НАДЕЖНОЕ ОРУЖИЕ,  
ЕСЛИ ЦЕЛЬ - БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

[www.antibiotic-save.ru](http://www.antibiotic-save.ru)

